n° 88. ouverture de cadavre. ~~[illegible]~~

Le vingt sept de mars mil sept cens
soixante sept j'eus occasion dexaminer
le cadavre dun homme qui paroissoit âgé
d'environ trente quatre a trente cinq ans.
ce homme etoit cul de jatte, avoit les deux jambes
pliées de manière que les talons regardoient
et touchoient aux fesses ; ce qui lui venoit a
ce quil disoit dune chute quil avoit fait ici
avoit douze ans en bas dun batiment, etant
allors couvreur de son metier. je dissequai
ses deux jambes et voici ce que je remarquai
tant dans la position que dans la figure des
parties.
Il ni avoit rien de particulier dans les articulations
des cuisses, excepté que je trouvai du sang en
place de sinovie. [ce homme etoit mort du
scorbut, et jai remarqué assez constamment dans
ces sortes de sujet une sinovie rougeatre ou du
sang dans les articulations.] Le muscle droit
anterieur s'atachoit inferieurement aux
aponevroses qui recouvrent le condile externe du
femur, son tendon faisoit ensuite un coude pour
se porter sur le millieu de la rotule et aider a la
recouvrir ~~comme cest lordinaire~~ ; le vaste
externe ~~[illegible]~~ en arrivant au genouil fournissoit
trois feuillets aponevrotique comme cest lordinaire

ARC 25 d 80

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

lune qui est formée par un faisseaux de fibres de
la partie lateralle esterne du musele, allois se
confondre avec laponevrose du fascia lata et une
production aponevrotique qui se detache du tendon
du droit anterieur, pour aller recouvrir le condile
esterne du femur. le second feuillet netoit pas
de meme dans sa situation naturelle; ce feuillet
qui est formé par les fibres les plus esterieures
ou les plus anterieure. si l'on veut du meme musele
se portoit sur le condile esterne du femur sous le
tendon du droit auquel il adheroit et laccompagnoit
ensuite sur la rotule pour ~~[illegible]~~ s'attacher
le troisieme feuillets qui vient du plan le plus
intime des fibres etoit dans sa situation naturelle
il se portoit a larotule en croisant sous l
laponevrose du vaste interne; le vaste interne
n'offroit rien de particulier. le crural qui
fournit aussi trois feuillets aponevrotiques le plus
esterieur ~~[illegible]~~ sattachoit a larotule au dessous de
l'insertion des vaste et les deux autres qui formoient
~~la [illegible]~~ lacapsule l'un en sattachant a une ligne
du bord dela rotule, lautre ~~en sattachant~~ aux
condiles du femur, nétoient plus separés
la capsule etoit adherente ~~[illegible]~~ aux os dans tous ses
points, les muscles etoient fort pâles; il ni
avoit rien de remarquable dans ceux dela
partie posterieure dela cuisse.

Les nerfs ~~interieur~~ formoient un plis Consciderable sous le jarret demanniere quil i enavoit environs un pouce et demi de replié dans les graisses; Le femur et le tibia ne formoient quune seulle piece on remarquoit seulement quelques inegalités a l'union des Condiles des deux os. les Condiles etoient d'ailleur bien distincts, la rotule etoit plus petite qué lordinaire et etoient soudée au millieu des quatres Condiles la tête du peroné etoit adherente au tibia et au femur.

la description que je viens de faire appartient a lextremitée gauche, je n'ai point dissequé les muscles de lextremitée droite j'ai seulement decouvert les os qui etoient soudés de meme, excepté que la tête du peroné etoit libre.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

o 2.